

緑地管理用

粒状除草剤

ボロシル

農林水産省登録
第17596号
ブロマシル粒剤

強力で持続効果の長い除草効果を発揮します

主成分ブロマシルの強力な殺草作用で長期間防除します。

地中に浸透し根から枯らします

土壤に浸透し根から吸収されて雑草を枯死させます。

手軽にオールシーズン散布できます

粒状ですからカンタン。四季を問わず雑草の処理はいつでもどこでも出来ます。

ブタクサ

スギナ

メヒシバ

ササ

一年生雑草

多年生雑草

エノコログサ

チガヤ

ツユクサ

ススキ

カラスノエンドウ 等

セイタカアワダチソウ 等



CBC GROUP



ボロシル

- 成分 プロマシル…4.0% 鉱物質、その他…96.0%
- 人畜毒性 普通物 LD₅₀ ラット♂ > 4.027mg/kg ラット♀ > 3.637mg/kg
- 魚毒性 A類
- 包装規格 1kg袋×20/5kg袋×4/1kgボトル×20/25kg袋


●適用場所と使用方法●

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロマシルを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、鉄道敷等	一年生雑草	雑草発生前 ↓ 生育期	8~12kg/10a	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に 全面土壌散布	1回
		多年生雑草		12~20kg/10a			

(多年生雑草を対象とした場合は、本剤1kgで約50~80㎡、約15~25坪処理できます。)


●上手な使い方●

草の根元に土中に浸透しやすいようにまくのがコツです。特にススキ・ヨシ・カヤなどの強害雑草には、株のまわりにひとつかみつつ置くように散布してください。



●散布上のご注意●


- ボロシルは全ての植物に影響を与えます。散布地に隣接して有用植物があり根が侵入していると思われる場合は散布を控えてください。特に果樹、桑などの根に気を付けてください。
- 散布地と周辺有用植物の位置関係(根の発達していく方向)等に充分ご注意ください。果樹等は、思わぬ長さで根が張っている場合があります。



有効成分

- 5 - プロモ - 3 - センドリーブチル - 6 - メチルウラシル……………4.0%
- 鉱物質、界面活性剤等……………96.0%
- 性状：淡褐色細粒
- 保管：直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

- 散布後強い雨が予想されるときは、使用を控えてください。傾斜地、田畑の隣接地などで表土と共に流れ込み葉害の原因になることがあります。
- 強風下での作業は控えてください。薬剤の飛散により葉害の原因になります。



取扱上のご注意

- 農耕地には使用しないでください。
- 薬剤使用後は手足顔等を石鹸でよく洗い、うがいをすると共に洗眼してください。
- 使い残したボロシルは、乾燥した場所に保管してください。長期に保存しても効果は変わりませんが湿気を帯び、固まる場合があります。
- 使用済みの空袋・空容器は、適切に処理してください。



CBC GROUP

総発売元 **CBC株式会社**

〒104-0052 東京都中央区月島2-15-13
TEL. (03) 3536-4763 FAX. (03) 3536-4781

製造所 エクスワールド テクノロジー リミテッド
英国ハートルプール州ブレングロード